

先天性幽门肥厚性狭窄\_普通外科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/610/2021\\_2022\\_\\_E5\\_85\\_88\\_E5\\_A4\\_A9\\_E6\\_80\\_A7\\_E5\\_c22\\_610565.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E5_85_88_E5_A4_A9_E6_80_A7_E5_c22_610565.htm)

因幽门括约肌先天性肥厚及痉挛，致胃内容物不能顺利通过而产生不同程度的幽门梗阻症状。【诊断】1.症状 婴儿在出生后数周内发生频繁呕吐，呕吐物为奶块，无胆汁，或有顽固性便秘。2.体征 上腹部可见胃型及胃蠕动波，幽门处常触及硬块。3.辅助检查

钡餐检查可显示胃扩张.间歇性蠕动亢进，幽门管异常增长，胃排空时间迟缓。 超声波可探及肥厚的幽门和幽门的长度及厚度。【治疗】1.非手术治疗 适于症状出现较晚(生后10~12周)且较轻者(患儿体重可维持或稍有增加)。可采取饮食调节治疗，包括适当洗胃，足量解痉药，静脉输入生理盐水与葡萄糖液等。2.手术治疗 幽门梗阻症状明显，腹部触及肿块，经非手术治疗无效，应行手术治疗。手术要点为纵行切开幽门的环状肌，使幽门内管得以扩大而解除梗阻。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)