

吻合口溃疡_普通外科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，
建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E5_90_BB_E5_90_88_E5_8F_A3_E6_c22_610578.htm 是指胃空肠吻合术后，在吻合口或某附近粘膜发生溃疡，又称复发性消化性溃疡。【诊断】病史提问：有消化性溃疡胃切除病史，症状与消化性溃疡术前相似而又有所不同，腹痛最多见，多呈发作性。夜间痛显著，常向它处放射，腹痛发作期较长，而缓解期较短。进食或制酸剂能暂时缓解。纳差、恶心、呕吐及体重减轻等比较常见，部分患者可并发穿孔，梗阻和出血。体检发现：腹部压痛部位常与腹痛一致，腹痛处有时可有腹肌紧张。病程长者，腹部复中可触及肿块。辅助检查：粪潜血：溃疡活动时，可持续性阳性。内镜检查：常见溃疡位于吻合口小肠侧，多数为单个溃疡，伴粘膜糜烂充血、水肿，活检可除外恶性溃疡。胃泌酸试验：显示bao增高，经五肽胃泌素或增大组织胺法，mao明显升高。血清胃泌素测定可增高。x线钡餐检查约半数病例可见吻合口畸形、狭窄、钡剂残留、龛影以及局部压痛等。【治疗措施】先经内科抗溃疡治疗，可延长疗程至3个月，若药物治疗无效，可行外科手术治疗。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com