

小肠恶性肿瘤_普通外科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式
，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E5_B0_8F_E8_82_A0_E6_81_B6_E6_c22_610593.htm 小肠肿瘤小肠肿瘤较少见，约占胃肠道肿瘤的1%~2%。良性肿瘤常见的是平滑肌瘤、腺瘤、脂肪瘤、血管瘤等，15%可发生恶变。恶性肿瘤中以恶性淋巴瘤多见，约占60%。小肠肿瘤多发生在回肠，恶性肿瘤较良性肿瘤多见。【诊断】1. 良性和恶性肿瘤在早期很难区别，随着病情发展均可出现腹胀、腹痛，伴恶心、呕吐、腹泻或便秘。严重者可出现肠道出血、梗阻和穿孔等症状。2. 全身消瘦、贫血，随肿瘤逐渐增大，腹部可触及包块。良性肿瘤包块常不固定，活动度大。恶性肿瘤质地硬，活动度小或固定。3. 钡餐检查，发现近端肠管扩张，不规则的充盈缺损，或肠套叠征象。向肠腔外生长的肿瘤，可显示肠管受压移位。4. 选择性肠系膜动脉造影或CT、B超检查有助诊断。5. 纤维小肠镜检查，可观察肿瘤部位、大小，行活组织检查确诊。【治疗】1. 良性肿瘤可行部分肠段切除，肠对端吻合术。2. 恶性肿瘤若病变局限，应行根治性切除术；已有远处转移，应争取姑息性切除；肿瘤与周围组织浸润固定，不能切除者，可作捷径短路手术，以解除梗阻。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com