

肛瘻_普通外科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E8_82_9B_E7_98_98__E6_99_AE_c22_610623.htm

肛瘻是肛管、直肠与肛门周围皮肤相通的感染性管道，其内口常位于齿线附近，外口位于肛周皮肤上，长年不愈。临床尚有瘻口不通到体外的内瘻。多源于肛门直肠周围脓肿，少数为结核、外伤、癌所致。若只有1个瘻管，称单纯性肛瘻，有多个瘻口和瘻管的称复杂性肛瘻。瘻管位于肛门直肠环平面以下者，为低位肛瘻；在此平面以上者，为高位肛瘻。【诊断】1.临床表现 肛周瘻口反复流脓，经久不愈，或时愈时溃，脓液刺激皮肤而感觉瘙痒和潮湿不适。当外口封闭时，局部疼痛明显，排便时加剧。复杂的或长期不愈的肛瘻，可有贫血、消瘦、排便不畅和便意不尽的感觉。2.检查 肛周皮肤有瘻口，可溃可闭，有的见多个外口，外口之间皮下可触及条索状物，有触痛，随索状物向上可达内口。 肛门镜见齿线处的肛窦常红肿，有分泌物，多为肛瘻内口。 寻找内瘻口时，可用探针由外口导入，或注入亚甲蓝查内口，对复杂瘻、高位瘻还可作瘻管x线造影。【治疗】1.非手术治疗 对局部有急性炎症者，可用抗生素，或中药清热利湿，热水坐浴，理疗等以控制发展，减轻症状。2.手术治疗 当急性炎症后脓肿形成时，应切开引流，从脓肿引流到瘻管形成一般需要3个月以上，因此不宜过早手术切除瘻管，否则会影响肛门的闭合功能。手术原则是将内口、外口、瘻管连同瘢痕一并切除，形成新鲜创面，使之逐渐愈合。其方法可依据部位、类型、内外口不同情况进行选择。3.常用手术方法 药捻脱管法。是祖国医学

的传统疗法之一，将化腐生肌的中药置入瘻管内，使瘻管与瘢痕腐烂脱落，形成新鲜创面而愈合。挂线疗法。适用于高位肛瘻，即内口在肛管直肠环平面上方。手术切除瘻管外侧段较浅部分，对肛管直肠环深部的剩余瘻管行挂线，使瘻管与肛门括约肌边离断边愈合，可免肛门失禁。肛瘻切开或切除术。浅部瘻管可将整个瘻管及瘢痕一次彻底切除。也可将瘻管纵形切开，清除管内坏死组织，创面敞开。近年来对低位单纯性肛瘻采用激光治疗、冷冻治疗、医用zt胶粘堵法等。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com