

胰腺瘘_普通外科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议
阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E8_83_B0_E8_85_BA_E7_98_98__c22_610635.htm

胰腺瘘大部分是由于急性重症胰腺炎术后并发症所致，亦可由于外伤，胰腺活检术后发生。【诊断】1.胰腺手术、外伤以及重症胰腺炎术后持续性腹痛、腹胀、发热，伤口及引流处有清亮液体，引流处剧痛。2.切口处皮肤糜烂，引流不畅时出现高热、上腹部炎性包块，抗生素治疗无效。3.辅助检查 渗出液淀粉酶常超过500苏氏单位。 逆行胰胆管造影可确定胰瘘的部位及胰管有无狭窄。【治疗】1.非手术治疗 主要是维持水与电解质平衡。 加强营养支持。 保持引流通畅。 应用药物如阿托品、奥曲肽等抑制胰腺外分泌功能。 应用氧化锌膏保护瘘口皮肤等治疗。大多数胰瘘可望获得自愈。2.手术治疗 对并发出血或经非手术治疗经久不愈的高流量（>1000ml/日）瘘，可根据瘘的位置，胰管有无狭窄等情况，选择不同的术式，如胰管肠道吻合，胰腺空肠吻合等术式。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com