

股疝\_普通外科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/610/2021\\_2022\\_\\_E8\\_82\\_A1\\_E7\\_96\\_9D\\_\\_E6\\_99\\_AE\\_c22\\_610649.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E8_82_A1_E7_96_9D__E6_99_AE_c22_610649.htm) 腹腔内或盆腔内脏器，通过股环脱出至股管中，或穿过股管脱出至大腿内侧皮下者，为股疝。【诊断】1. 在大腿内侧，腹股沟韧带下耻骨结节外下方，自股管经卵圆窝突出包块，一般无明显症状，少数患者有胀痛感。多见于中年以上妇女。2. 包块一般不大，半圆形，突出后不易还纳，常因出卵圆窝后反向上扩大甚至可误诊。包块极少移动，咳嗽冲动感不明显。3. 出现嵌顿时，有腹痛、呕吐、腹胀等肠梗阻症状。【治疗】1. 经腹股沟韧带上修补主要用于巨大股疝或嵌顿、绞窄者。切口与斜疝相同，切开腹横筋膜，提出疝囊、还纳内容物，高位结扎疝囊，切除多余疝囊。将腹横筋膜缝于耻骨韧带，再将耻骨肌筋膜和陷窝韧带与腹股沟韧带缝合，按层缝合腹壁。2. 经腹股沟韧带下修补主要用于年老患者或较小股疝。可在腹股沟韧带下约2cm作平行或纵行切口，找见疝囊后，由下而上剥离至疝囊颈部，切开疝囊，还纳内容物，高位结扎疝囊，然后自内侧开始将腹股沟韧带与陷窝韧带、耻骨肌筋膜缝合以关闭股环。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)