

十二指肠旁疝_普通外科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E5_8D_81_E4_BA_8C_E6_8C_87_E8_c22_610654.htm 胚胎发育过程中，在十二指肠、空肠交界处的下方形成隐窝，致小肠可能进入而发生内疝称为十二指肠旁疝。左侧十二指肠旁病是指肠管进入landzert隐窝而形成.而右侧十二指肠旁病是指肠管进入waldeyer隐窝而形成。【诊断】1.患者可出现急性、慢性或反复发作的完全或不完全的肠梗阻症状和体征。2.上腹左侧或右侧有时可触及肿块。3.x线腹部平片可见充气肠袢聚集一团。钡餐检查可发现团状小肠聚集在左上腹或右上腹、肠袢不易分离，边缘呈圆形，胃与结肠移位，下腹部与盆腔内小肠甚少。【治疗】手术复位，并缝闭疝囊口，缝闭时，左侧十二指肠旁疝，应注意防止损伤肠系膜下静脉。右侧十二指肠旁疝，应注意防止损伤肠系膜上动脉。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com