

网膜孔疝_普通外科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E7_BD_91_E8_86_9C_E5_AD_94_E7_c22_610655.htm

小肠和部分结肠通过网膜孔（Winslow孔）进入小网膜腔内称为网膜孔疝。因网膜孔前有胆总管、门静脉及肝动脉，后为腔静脉及脊柱，故疝入的肠管易产生绞窄。【诊断】1.主要表现为肠梗阻症状及体征，一般发展缓慢。2.腹痛在饭后、立位及活动后加重，有些患者虽腹痛剧烈，但极少呕吐。3.如发生嵌顿，腹痛加剧，在上腹部可触及包块。4.发生绞窄时，可迅速引起休克。5.腹部x线片可见胃区附近有扩张肠曲或液平面。【治疗】1.一旦怀疑本病，应行手术治疗，将嵌入肠袢复位后，缝闭网膜孔，注意勿损伤门静脉、肝动脉、胆总管及腔静脉。2.如复位困难，可先经肝胃韧带作嵌顿肠袢穿刺减压，然后进行复位。3.如肠管已广泛坏死，应做肠切除肠吻合术，切除肠袢可从肝胃韧带左侧移出体外。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com