

髂窝脓肿_普通外科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E9_AB_82_E7_AA_9D_E8_84_93_E8_c22_610667.htm

髂窝脓肿系指髂窝的急性化脓性感染。多继发于血行或淋巴感染。致病菌以金黄色葡萄球菌最为多见。【诊断】1. 症状发病急骤，寒战和高热，伴有食欲不振、恶心、呕吐、乏力等全身中毒症状，髂窝多有持续性钝痛，不放射。2. 体格检查体温可高达40℃，脉搏快，但髂窝包块很少扪及波动感。髋关节呈不同程度的保护性屈曲状。3. 辅助检查 白细胞计数和中性粒细胞均明显增高。 b 超检查可见局部肿块或液平段。".诊断性穿刺可抽出脓液。应注意与急性阑尾炎、急性化脓性髋关节炎、结核性脓肿相鉴别。【治疗】1.发病初期，脓肿症状不明显，可采用非手术疗法。如肌注抗生素、局部热敷、理疗和服用中药清热解毒药物等。2.脓肿形成后，可切开引流术。术中应避免损伤血管，脓腔置橡皮管引流，继续用抗生素和支持疗法。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com