

直肠损伤\_普通外科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/610/2021\\_2022\\_\\_E7\\_9B\\_B4\\_E8\\_82\\_A0\\_E6\\_8D\\_9F\\_E4\\_c22\\_610683.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E7_9B_B4_E8_82_A0_E6_8D_9F_E4_c22_610683.htm) 【诊断】1. 因直接外伤所致，或骨盆骨折时合并损伤。2. 腹膜的反折以上破裂与结肠伤引起的腹膜炎相似；反折以下破裂可引起直肠周围感染，无腹膜炎表现。3. 直肠内出血可从肛门排出，直肠指诊有血，可触及直肠破口。【治疗】1. 腹膜反折以上破裂应剖腹探查。破口小、污染轻者可行修补，近端乙状结肠造口或术后直肠内置排气管；破口大者，行直肠切除吻合，同时行乙状结肠造口为宜。2. 腹膜反折以下破裂充分引流直肠周围间隙，需行乙状结肠造口，待直肠伤口愈合后，再次手术关闭造口。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)