

腹膜后血肿_普通外科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，
建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E8_85_B9_E8_86_9C_E5_90_8E_E8_c22_610684.htm

【诊断】1. 骨盆骨折、脊柱骨折、腹膜后器官和血管损伤出血后，血液在腹膜后间隙扩散形成血肿。2. 临床表现因各脏器损伤的程度不同而各异。可有内出血症状和体征，腰背部疼痛，并发生肠麻痹而腹胀，肠鸣音减弱等。3. 血肿破入腹腔出现腹内出血的体征，可出现移动性浊音，诊断性腹腔穿刺可抽出不凝血液，但穿入血肿内也可抽得不凝血液，常与腹腔内实质性脏器破裂相混淆，此种情况只能按内出血处理，行剖腹探查。**【治疗】**1. 腹膜后血肿不合并脏器损伤，宜保守治疗，经抗休克、抗感染，加强骨折等原发伤治疗，血肿多可自行吸收痊愈。2. 腹膜后脏器及大血管损伤者，应根据具体脏器损伤情况，予以手术处理。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com