

动脉瘤_普通外科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议
阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E5_8A_A8_

[E8_84_89_E7_98_A4__c22_610686.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E5_8A_A8_E8_84_89_E7_98_A4__c22_610686.htm) 为动脉壁受破坏或结构异常而形成的囊样扩张性病变，分为真性、假性和夹层动脉瘤，多为动脉硬化或创伤所致，梅毒性少见。可发生在颈动脉、锁骨下动脉、腋动脉、肱动脉、桡动脉、髂动脉、股动脉和动脉等部位，以股动脉和动脉为好发部位。【诊断】1

．常有动脉硬化、高血压或创伤史。2．患肢远端动脉供血不足，若瘤体较大，压迫附近神经、静脉，可出现肢体疼痛、麻木、静脉曲张、肿胀。颈动脉瘤可引起脑供血不足，压迫邻近组织，可出现声音嘶哑、呛咳、呼吸困难及霍纳综合征。3．沿动脉行径有圆形或梭形肿块，表面光滑、紧张而有弹性，膨胀性搏动，可触及细震颤，闻及收缩期吹风样杂音。压迫近端动脉，肿块缩小，搏动、震颤和杂音消失。4．x线片，瘤壁可有钙化影。超声显像有助于诊断。动脉造影可确定瘤体部位、大小、范围及侧支循环情况。【治疗】手术为惟一有效的治疗方法，一旦诊断确定，应尽早手术，以防破裂或栓塞。手术方法：动脉瘤切除、动脉对端吻合或血管移植术。颈动脉瘤术前行matas试验，术中头部降温，尽量缩短阻断血流时间，或用暂时性内、外转流，以维持脑组织的血液灌注。动脉瘤腔内修补术。适于假性动脉瘤或动脉瘤与邻近神经、血管紧密粘连者。动脉瘤切线切除、动脉修补术。适于囊状膨出的动脉瘤。动脉瘤包裹术。适于动脉瘤无法切除或患者不能耐受切除者。动脉瘤近、远端动脉结扎、自体静脉非解剖位旁路移植、瘤腔引流术。适于

感染性动脉瘤。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com