

头皮裂伤_神经外科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E5_A4_B4_E7_9A_AE_E8_A3_82_E4_c22_610709.htm 头皮裂伤系为锐器或钝器伤所致。由于帽状腱膜具有纤维小梁结构的解剖特点，头皮血管破裂后血管不易自行收缩而出血较多，可引起出血性休克。【诊断】1. 临床表现（1）活动性出血接诊后常能见到白头皮创口有动脉性出血。（2）休克在创口较大、就诊时间较长的病人可有出血性休克的临床表现。（3）需检查创腔深度、污染程度、创底有无骨折或碎骨片，如果发现有脑脊液或脑组织外溢，需按开放性颅脑损伤处理。2. 辅助检查（检查应在急诊止血后进行）（1）实验室检查1）血常规化验了解机体对创伤的反应状况，有无继发感染。2）血红蛋白和血细胞比容持续下降表明出血严重程度。（2）影像学检查1）头颅x线摄片，包括正位、侧位和创口部位切线位平片。2）必要时可考虑行头颅ct，以除外颅内异常。【治疗】头皮血供丰富，其清创缝合的时限允许放宽至24小时。采用一期全层缝合，其后注射破伤风抗毒素，并根据创伤情况应用抗生素、补液输血等。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com