

脑震荡\_神经外科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议  
阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/610/2021\\_2022\\_\\_E8\\_84\\_91\\_E9\\_9C\\_87\\_E8\\_8D\\_A1\\_\\_c22\\_610717.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E8_84_91_E9_9C_87_E8_8D_A1__c22_610717.htm)

脑震荡是指头部受力后在临床上观察到有短暂性脑功能障碍。脑的大体标本上无肉眼可见到的神经病理改变，显微病理可有毛细血管充血、神经元胞体肿大、线粒体和轴索肿胀。【诊断】1. 临床表现（1）意识改变受伤当时立即出现短暂的意识障碍，可为神志不清或完全昏迷，常为数秒或数分钟，大多不超过半个小时。

（2）逆行性遗忘病人清醒后多不能回忆受伤当时乃至伤前一段时间内的情况。（3）短暂性脑干症状伤情较重者在意识改变期间可有面色苍白、出汗、四肢肌张力降低、血压下降、心动徐缓、呼吸浅慢和各生理反射消失。（4）其他症状可有头痛、头晕、恶心、呕吐、乏力、畏光、耳鸣、失眠、心悸和烦躁等。（5）神经系统检查无阳性体征。2. 辅助检查（1）

实验室检查腰椎穿刺颅内压正常；脑脊液无色透明，不含血，白细胞数正常。（2）神经影像检查1）头颅x平片检查无骨折发现。2）头颅ct检查颅、脑内无异常。【治疗】1. 观察病情变化 伤后短时间内可在急诊科观察，密切注意意识、瞳孔、肢体运动和生命体征的变化。对于离院病人，嘱其家属在当日密切注意头痛、恶心、呕吐和意识障碍，如症状加重即来院检查。2. 卧床休息 急性期头痛、头晕较重时，嘱其卧床休息，症状减轻后可离床活动。3. 对症治疗 头痛时可给予

颅痛定等镇痛剂。对有烦躁、忧虑、失眠者可给予地西洋、三溴合剂等药物。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)