

外伤性颈内动脉血栓形成_神经外科疾病库 PDF转换可能丢失
图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E5_A4_96_

[E4_BC_A4_E6_80_A7_E9_c22_610731.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E5_A4_96_E4_BC_A4_E6_80_A7_E9_c22_610731.htm) 颅脑损伤合并颈部
伤，颈内动脉内膜受损可形成血栓。常发生在颈内动脉起始
点，向上延伸到颅内颈内动脉与后交通动脉连接处，导致颈
内动脉或大脑中动脉供血区急性脑缺血及脑梗塞。【诊断

】1.轻型或中型颅脑伤患者，伤后即刻或数小时至数日内出
现偏瘫、失语、抽搐，可有意识障碍，颈动脉触诊，搏动减
弱或消失。完全性颈内动脉闭塞伴脑侧支循环不足时，可引
起大片脑梗塞，严重脑水肿与脑疝。2.脑血管造影显示颈内

动脉闭塞。【治疗措施】1.非手术治疗症状轻者采用脱水治
疗，静脉输入脑活素、胞二磷胆碱、能量合剂、706代血浆、
碳酸氢钠，尚可采用颈交感神经封闭和吸氧治疗，有一定疗
效。2.手术 采用颈内动脉血栓内膜切除术。此手术宜尽早

进行。 去骨瓣减压术。适用于颈内动脉完全闭塞引起脑疝
者。尚可采用颞浅 - 大脑中动脉吻合术。 椎动脉也可合并
血栓形成，而产生椎动脉缺血症状。经一般治疗无效者可行
枕动脉 - 小脑后下动脉吻合或锁骨下动脉 - 椎动脉吻合，以

改善脑供血。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载
。详细请访问 www.100test.com