

外伤后脑脂肪栓塞\_神经外科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/610/2021\\_2022\\_\\_E5\\_A4\\_96\\_E4\\_BC\\_A4\\_E5\\_90\\_8E\\_E8\\_c22\\_610732.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E5_A4_96_E4_BC_A4_E5_90_8E_E8_c22_610732.htm) 脂肪栓塞综合征是创伤后（如骨折）脂肪滴进入血液并在肺、脑等部位造成机械性阻塞，栓塞及其毒性作用引起一系列呼吸、循环的病理改变。【治疗】1.呼吸支持治疗 这是脂肪栓塞综合征最基本的治疗措施。2.吸氧，进行呼吸、脉搏、血气分析监测。3.尽早对骨折行切开复位内固定术可降低本征的发生率，但在本征发生时宜使用石膏或外固定架稳定骨折。4.记出入量，保持水、电解质及酸碱平衡。补液应保持适度的负平衡。5.症状加重，血氧分压持续在7.98kpa(60mmhg)以下者，应及时行气管切开或气管插管，用人工呼吸机维持呼吸。6.应用激素可降低机体应激反应从而减轻水肿、降低毛细血管渗透性、减轻游离脂肪酸的毒性作用。7.使用乙醇、肝素、高渗糖、利尿剂、低分子右旋糖酐等药物，可降低游离脂肪酸的毒性、减轻肺间质水肿、加强心肌收缩、改善微循环等。8.在不影响呼吸功能的前提下，适量使用镇静剂。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)