

颅内转移瘤\_神经外科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，  
建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/610/2021\\_2022\\_\\_E9\\_A2\\_85\\_E5\\_86\\_85\\_E8\\_BD\\_AC\\_E7\\_c22\\_610765.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E9_A2_85_E5_86_85_E8_BD_AC_E7_c22_610765.htm)

颅内转移瘤为身体其他部位恶性肿瘤经血液或其他途径转移至颅内所致，多见于肺癌、胃癌及乳腺癌等转移。可发生于颅内任何部位，以大脑中动脉分布区如额叶和顶叶常见，转移灶可为单发或多发。多位于额后、顶叶及枕叶的脑皮质及皮质下。灰褐色或灰白色，质地不一，较脆软。切面可呈颗粒状，有时瘤内发生坏死，形成假性囊肿，含有液化坏死组织。肿瘤境界清楚，周围脑组织水肿明显。显微镜下显示：肿瘤组织呈浸润性生长，转移瘤的组织形态与原发瘤相似，但假如原发瘤细胞分化较低，则转移瘤可与颅内原发的胶质瘤不易区分。【诊断】1.临床表现(1)发病年龄与病史 病人多为中老年人，常有恶性肿瘤病史，但亦有病史不明者。一些病人神经系统症状可先于原发部位症状。病史较短，病情发展快。(2)精神症状 病人常表现为精神异常，颅内压增高，运动感觉异常及癫痫。(3)体格检查 需做全身各系统及神经系统查体。2.辅助检查(1)系统检查1)前列腺及甲状腺等部位检查。2)女性病人应行乳腺、妇科检查。3)腹部b超。4)x线胸片，根据情况选择骨扫描。5)胸、腹部ct扫描。(2)头颅ct和mri检查 颅内可显示多个或单个病灶，多为低密度或等密度，周边水肿明显，注药后呈不规则强化。【治疗】1.手术治疗 病灶表浅、单发，病人全身状况良好者，宜手术摘除。2.放疗和/或化疗。3.原发病灶明确者，根据具体情况可行手术、放疗和/或化疗。4.放射外科治疗无上述适应证但转移灶不超过4个，单病灶直径不

超过3cm者，考虑做 刀或x刀。 100Test 下载频道开通，各类  
考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)