

颅内异常血管网症_神经外科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E3_80_80_E9_A2_85_E5_86_85_E5_c22_610783.htm 烟雾

病(moyamoyadisease)病因不明，以儿童发病多见。其病理解剖基础为大脑基底异常纤细的网状新生血管网形成，表现为颈内动脉末端进行性狭窄或闭塞，以及广泛的颅内之间和颅内外之间的血管吻合为特征的脑血管病。【诊断】1. 临床表现（1）脑缺血 一般儿童以脑缺血表现常见，严重者可出现脑梗死，个别病人伴有癫痫、感觉障碍、智力迟钝和头痛。（2）脑出血 成人多表现为脑室内出血、蛛网膜下腔出血、卒中样发作、癫痫发作和不自主动作。2. 辅助检查（1）神经影像学检查1) 全脑血管造影确诊需全脑血管造影dsa2) spect或ect 可了解脑缺血程度3) 头颅ct和mri 了解全脑情况。（2）实验室检查1) 血免疫球蛋白。2) 脑脊液bfgf(3) 脑电图。（4）颈内动脉超声。【治疗】1. 非手术治疗（1）脑室内出血1) 病人如意识不清，及时行脑室穿刺外引流。2) 止血（6-氨基己酸等）、脱水等对症治疗。（2）脑梗死的治疗主要是扩张血管和其他对症治疗。2. 手术治疗（1）手术适应证 脑缺血临床症状明显，可以考虑手术治疗。（2）治疗方法 尚无疗效肯定的方法，下述方法可供选择。1) 脑-颞浅动脉贴敷术、脑-颞肌贴敷术、脑-硬脑膜动脉贴敷术（edas）、大网膜颅内移植术等。2) 颞浅动脉与大脑中动脉吻合术。3) 对于ect检查有双额缺血的病人，可行双额钻孔，蛛网膜剥脱术。4) 双侧颈内动脉外膜剥脱术。（3）术后处理贴敷术及血管吻合术的病人术后应用血管扩张药物。3.

出院医嘱 出院后需门诊长期随诊复查。6个月及12个月后复查脑血管造影或ect。出院后继续应用扩张血管及神经营养药物。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com