

脑动脉硬化症_神经外科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式
，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E8_84_91_E5_8A_A8_E8_84_89_E7_c22_610787.htm

指脑动脉硬化后，因脑部多发性梗塞、软化、坏死和萎缩引起神经精神障碍。【

诊断】一、病史及症状：起病缓慢，可有冠心病、高血压、高血脂及糖尿病等病史，症状为：1.头痛、头昏、注意力不集中、工作能力下降、记忆力明显减退，常有眩晕发作。早期主要为近事遗忘和思维迟缓，晚期则记忆衰退、思考困难、言语迟钝、情感呆滞，并有强哭强笑，最后陷入痴呆。2.性格改变：可有多疑、敏感或疑病等各种妄想。晚期行动幼稚或有各种反社会道德行为。二、体检发现：有多种不同程度的神经体征，如偏瘫、病理反射、掌颌反射、偏身感觉减退、腱反射不对称、头手震颤等。有时呈现假性球麻痹或帕金森综合征。眼底检查可见眼底动脉变细、反光增强及交叉压迹等。三、辅助检查：脑血流图有上升时间延长，重搏波减弱或消失，主峰夹角变钝，波幅下降表现；颅脑CT常有程度不等的脑萎缩和大小、数量不等的梗塞灶。四、鉴别：需与各种痴呆及精神病鉴别。【**治疗措施】**一、环扁桃

酯(400mg 3次/d)、都可喜(40mg 1-2次/d)、脑益嗪(25mg 3次/d)、罂粟碱(60mg 2次/d)等改善脑部血循环，还可用活血化瘀中药及706代血浆500ml静滴,1次/d。二、- 氨酪酸、ATP、辅酶Q10、脑通、胞二磷胆碱等改善脑代谢。三、用脂必妥、非诺贝特、舒降之等降血脂药物。四、有焦虑者可使用安定、氯硝安定等；兴奋、妄想、幻觉者可用奋乃静或氟哌啶醇；抑郁者用黛安神、百忧解、赛乐特、丙咪嗪等抗

抑郁剂（心功能不佳者慎用）；帕金森综合征可用左旋多巴等。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com