

枕寰关节脱位_神经外科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E6_9E_95_E5_AF_B0_E5_85_B3_E8_c22_610802.htm 头面部遭受突然打击，而颈和躯干的惯性继续向前，可能在枕骨和寰椎连结处造成剪切作用，导致枕寰关节脱位。分为前方移位或后方移位两型。一旦并发神经损伤属致命伤。【诊断】1. 临床表现 枕寰关节脱位最主要的特征是神经系统受损。因为延髓受损后致呼吸衰竭，所以绝大多数患者立即死亡，而幸存者表现无或轻微脊髓损伤，也可有高位颈髓损伤征象。局部症状是枕颈部疼痛和头部屈伸活动受限。2. 诊断标准 主要是依靠临床表现和上颈椎x线片，测量齿状突尖至枕骨大孔前缘距离，正常成人的枕齿间距为4~5mm，超过者即可诊断。【治疗】包括两个方面。(1)呼吸功能衰竭和脊髓损伤的治疗。(2)脱位的复位和固定宜先采用halo头环牵引，后期行枕骨-颈2融合。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com