

寰枢椎前脱位\_神经外科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式  
，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/610/2021\\_2022\\_\\_E5\\_AF\\_B0\\_E6\\_9E\\_A2\\_E6\\_A4\\_8E\\_E5\\_c22\\_610804.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E5_AF_B0_E6_9E_A2_E6_A4_8E_E5_c22_610804.htm) 通常为屈曲暴力所致

，当寰椎受到剪切力时，引起横韧带和关节囊撕裂。【诊断】1.临床表现 颈部不稳感，疼痛或僵硬，活动受限，如一侧关节脱位可出现斜颈。极少数会出现颈髓受压的症状和体征。2.诊断依据 主要依靠临床表现及影像学检查。x线张口位表现为枢椎齿状突与寰椎两侧块间距不对称，侧位片显示寰椎前弓的后缘与齿状突前缘的距离增大，正常时该间距为3mm(成人)和5mm(儿童)。必要时做ct或mri检查，了解脊髓受压情况。【治疗】早期牵引复位，后期可考虑寰枢椎融合。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)