

结核性脑膜炎\_神经内科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式  
，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/610/2021\\_2022\\_\\_E7\\_BB\\_93\\_E6\\_A0\\_B8\\_E6\\_80\\_A7\\_E8\\_c22\\_610922.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E7_BB_93_E6_A0_B8_E6_80_A7_E8_c22_610922.htm) 结核性脑膜炎是脑外

结核病灶中的结核杆菌经血行侵入脑及脑膜所引起的炎症。

儿童及青年人较多见，成人也不少见。【诊断】1.临床表现

粟粒性结核病人多有结核性脑膜炎。粟粒性结核病一经确诊

，必须注意脑膜炎或脑内其他结核性病变，非粟粒性结核病人

，其脑膜炎呈缓慢隐袭或亚急性起病，早期可为精神萎靡

、食欲减退、疲乏少动、低热盗汗。随后出现头痛、呕吐、

颈强直、癫痫发作、脑膜刺激征、失语、脑神经麻痹、肢体瘫痪

，意识由正常转为嗜睡，重者出现谵妄、昏迷，严重的颅内

高压和脑积水可导致呼吸、循环衰竭而死亡。2.实验室检查

(1)脑脊液常规检查：脑脊液压力增高。白细胞总数多

为 $(200\sim 400)\times 10^6/l$ ，少数可达 $1000\times 10^6/l$ ，单个核细胞占优势。

蛋白质含量多在 $1g\sim 3g/l$ ，糖和氯化物含量下降。(2)结核

杆菌pcr检查:取脑脊液以pcr检测结核杆菌dna片段，其特异性

及敏感性均甚佳。(3)酶联免疫吸附试验：取脑脊液查结核

杆菌抗体，特异性及敏感性均较好。(4)胸部x线片：系统

性检查以发现结核病灶，对结核性脑膜炎诊断有重要帮助。

(5)其他检查脑脊液离心沉淀物动物腹腔接种和脑脊液薄膜

检测结核杆菌，均有助于病原学诊断。【治疗】1.抗结核治

疗应坚持不短于1年的长期治疗，为减少结核杆菌的耐药性

，多采用3~4种药物的联合治疗。常用的药物为异烟

肼 $100mg\sim 200mg$ ，口服，3次/日，利福平 $450mg$ ，口服，1次/

日，吡嗪酰胺 $250mg\sim 500mg$ ，口服，3次/日。还可加用链霉

素500mg，肌注，2次/日。2.糖皮质激素有减轻中毒症状，减轻蛛网膜粘连和降低颅内压的作用，在抗结核药物足量应用的前提下，糖皮质激素有重要的辅助治疗作用，常用地塞米松10mg，静脉注射或滴入，1次/日。3.降低高颅内压常用20%甘露醇250ml静脉滴入，2次/日。50%甘油糖浆50ml~100ml，口服，3~4次/日。4.对症治疗用抗癫痫药治疗癫痫发作，早期适当应用改善脑循环代谢的药物，减少脑损害以及降低高热、改善营养状况等均不可忽视。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)