

单纯性胃十二指肠溃疡_消化内科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/611/2021_2022__E5_8D_95_E7_BA_AF_E6_80_A7_E8_c22_611068.htm 消化性溃疡【诊断】

1.慢性病程，周期性发作，常与季节变化、精神因素、饮食不当有关，或有长期服用能致溃疡的药物史。2.上腹隐痛、灼痛或钝痛。疼痛多有节律性，常于空腹或餐后1/2~2h发生。疼痛常伴反酸、嗝气及上腹饱胀。注意是否有呕血、黑便史。3.胃溃疡患者基础泌酸量、最大泌酸量正常或偏低，十二指肠溃疡基础泌酸量、最大泌酸量常增高。4.胃镜或x线钡餐检查结果可确诊。发现胃溃疡应做活体组织检查，特别是溃疡直径大于2.5cm应排除恶性变。【检查】1.血甲胎蛋白（afp），癌胚抗原（cea）。2.大便潜血阳性者，应复查，直至阴转。3.胃液分析、胃镜或x线钡餐。4.必要时行腹部b型超声检查。【治疗】1.饮食治疗：无并发症病人予流质饮食或半流饮食。勿用辛辣厚味食物，应戒烟酒。2.药物治疗（1）抑酸药：h₂受体阻滞剂，如西咪替丁（甲氰咪胍）800~1200mg/d，雷尼替丁0.152/d，法莫替丁20mg, 2/d；质子泵抑制剂，如奥美拉唑20mg,1/d；兰索拉唑30mg, 1/d。（2）保护胃肠粘膜药。如硫糖铝4片，3/d；麦滋林-s颗粒0.67g,3/d；替普瑞酮（施维舒）、珍珠层粉等。（3）促进溃疡愈合药。如甘珀酸钠（生胃酮）、胸腺蛋白口服液（欣洛维）。（4）抗胆碱能类药。如普鲁本辛15mg(，3/d；山莨菪碱(654-2) 10mg，肌注或口服。（5）清除幽门螺杆菌药物。如阿莫西林0.5g,4/d:；甲硝唑0.2g, 3/d；四环素0.5g, 3/d*；痢特灵0.2g, 3/d；枸橼酸铋钾（德诺）120mg, 3/d；枸橼酸铋钾颗粒（丽

珠得乐) 110mg, 3/d。 3.中医中药治疗。 100Test 下载频道开通
， 各类考试题目直接下载。 详细请访问 www.100test.com