

结肠息肉\_消化内科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/611/2021\\_2022\\_\\_E7\\_BB\\_93\\_E8\\_82\\_A0\\_E6\\_81\\_AF\\_E8\\_c22\\_611108.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/611/2021_2022__E7_BB_93_E8_82_A0_E6_81_AF_E8_c22_611108.htm) 结肠粘膜炎症或受到慢性刺激，引起息肉或腺瘤样改变。可为单发或多发，以乙状结肠和直肠为多。【诊断】1.便血或粘液样便，可有里急后重，便秘或排便次数增多。低位蒂长息肉可随排便时脱出肛外。2.肛指检查，可触及低位息肉。3.钡剂灌肠可显示单个或多个充盈缺损。4.纤维结肠镜检查，可直接窥见病变的形状、大小、范围，并通过活组织检查明确息肉性质。【治疗措施】1.低位带蒂息肉，可结扎切除。无蒂而直径 $<1.0\text{cm}$ 者，可直接电灼切除。2.高位带蒂息肉，可在纤维结肠镜下高频电切除。3.息肉较大，不规则，基底广，可经腹作肠段切除。4.息肉一旦癌变，则应按结肠癌行根治性手术。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)