

酒精性肝病_消化内科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，
建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/611/2021_2022__E9_85_92_E7_B2_BE_E6_80_A7_E8_c22_611128.htm

酒精性肝病是长期酗酒所致酒精中毒性肝脏疾病，包括脂肪肝、酒精性肝类和酒精性肝硬化，我国大城市酒精性肝病发病率有上升倾式。【**诊断**】病史及症状酒精性肝病缺乏特异性临床表现，因此诊断的目的：1.确定是否酒精性肝病；2.酒精性肝病在临床病理处于哪个阶段；3.与其他肝病的鉴别。诊断过程中应详细讯问病史，特别是饮酒史。包括饮酒的种类、量、时间、方式和进食的情况、注意了解有否贫血，周围神经炎等症状。体检发现程度不同的贫血貌，偶有黄疸，肝肿大，酒精性肝硬变失代偿期有脾大，蜘蛛痣，腹水等同其他肝硬变。辅助检查ast/alt \gt .1，多在2 - 5之间akp、ggt增高，血清血蛋白降低，球蛋白升高，凝血酶原时间延长且维生素k不能纠正。脂肪肝阶段血内甘油三脂，前脂蛋白、胆固醇轻至中度增高，酒精性肝硬变期胆固醇正常，但胆固醇酯和总胆固醇比值下降。影像学检查b型超声波、ct出现脂肪肝或肝硬变的相变表现。【**治疗措施**】戒酒、补充多种维生素如维生b、c、k等。供给足够的热量、蛋白质。肾上腺皮质激素对重症酒精性肝炎有改善急性期及脑症状作用，但应注意并发感染，常用强的松龙30 - 40 μ g/d，口服，4 - 8周，丙基硫氧嘧啶，对轻、中度酒精性可能增加临床康复，300mg/d，口服4周，秋水仙碱1mg/d，每周口服5日，连续服药30d以上，能减轻纤维化及改善症状。酒精性肝硬化有并发症者收入院。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

