

急性心功能不全\_心血管内科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/611/2021\\_2022\\_\\_E6\\_80\\_A5\\_E6\\_80\\_A7\\_E5\\_BF\\_83\\_E5\\_c22\\_611197.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/611/2021_2022__E6_80_A5_E6_80_A7_E5_BF_83_E5_c22_611197.htm) 急性心力衰竭以急性左心衰竭最常见，主要表现为急性肺水肿。可见于急性心肌梗死、高血压性心脏病、风湿性心脏病二尖瓣狭窄等。【诊断】1.症状 突感胸闷、呼吸困难、被迫端坐、咳嗽、咳出大量白色粉红色泡沫样痰，严重者可有大量泡沫样液体由口鼻涌出。2.体征 焦虑恐惧、烦躁不安、面色苍白、口唇紫绀、大汗淋漓、四肢湿冷、两肺满布湿音，心尖部可闻及舒张期奔马律，脉搏细弱，血压下降，可因休克或窒息而致死。【治疗】1.身体位置 取坐位，两腿下垂，以减少静脉血回流。2.给氧 鼻管或面罩给氧，流量6l~8l/分。可使氧气通过20%~30%乙醇或1%硅酮液后再吸入，去泡作用较好。3.镇静 吗啡10mg或哌替啶50mg，皮下或肌注。4.利尿 呋塞米（速尿）20mg~40mg，或依他尼酸（利尿酸钠）25mg~50mg，静注，低血容量时忌用。5.强心药 近期末用过洋地黄类药物者，可用毛花苷丙（西地兰）0.2mg~0.4mg或醋毒毛花苷k0.25mg加入葡萄糖液20ml中静脉缓注。二尖瓣狭窄所致肺水肿，不宜用洋地黄。6.血管扩张剂 硝普钠50mg，加入葡萄糖液250ml中，静滴，开始剂量为8ug~16ug/分，以后每5~10分钟增加5ug~10ug。酚妥拉明10mg~20mg，加入葡萄糖液250ml中，以0.05mg~0.1mg/分，静滴，必要时可隔5~10分钟增加0.1mg。以上用药应密切监测血压，血压偏低者，可与多巴胺合用。同时可给予硝酸甘油0.5mg，或硝酸界山梨酯（消心痛）5mg，舌下含服。7.氨茶碱 0.25mg，用10%葡萄糖液20ml

稀释后，缓慢静注。低血压、急性心肌梗死者慎用。副作用有心悸、头痛、低血压、室性心动过速甚至室颤。8.糖皮质激素 氢化可的松100mg ~ 200mg，或地塞米松5mg ~ 10mg，加入葡萄糖液中，静滴。9.其他 积极治疗原发病和诱因。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)