

围产期心肌病_心血管内科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/611/2021_2022_E5_9B_B4_E4_BA_A7_E6_9C_9F_E5_c22_611228.htm 亦称分娩前后心肌病。妊娠前无心脏病史，于妊娠后期或产后出现心脏扩大，心力衰竭，心律失常，且无其他原因可寻。病因不明，可能的发病因素有营养不良、病毒感染、自身免疫机制紊乱或机体容量负荷过度等。【诊断】本病多见于年龄较大、营养不良的经产妇，起病大多在妊娠最后1个月或产后5个月内。出现左、右心衰竭的症状，心慌、气短、胸痛、咯血、肝大、水肿、心脏扩大、各种心律失常、动脉栓塞等。辅助检查、心电图、超声波、（线检查等，均与扩张型心肌病相似。除外其他病因的心脏病，即可诊断为本病。【治疗】本病以心力衰竭为主要表现，针对心力衰竭的治疗与扩张型心肌病相同。由感染诱发者，应抗感染；由于容量负荷过度者，用利尿剂即足以消除症状，使扩大的心脏恢复正常。心律失常按不同类型选用抗心律失常药物。为防复发，应避孕。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com