

高血压性心脏病_心血管内科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/611/2021_2022__E9_AB_98_E8_A1_80_E5_8E_8B_E6_c22_611269.htm 原发性高血压或继发性高血压并发左心室肥厚或心力衰竭时，称为高血压性心脏病。【诊断】1．病史 有高血压病史数年。2．症状 心功能代偿期仅有高血压病一般症状。心功能代偿不全时，可出现左心衰症状，轻者于劳累后呼吸困难，重者则出现端坐呼吸，心性哮喘，甚至有急性肺水肿表现。久病患者可出现恶心、腹胀和右上腹部疼痛等右心衰竭症状。3．体征 心界向左下扩大，主动脉瓣区第二心音亢进，伴有收缩期吹风样杂音。心尖部可听到收缩期吹风样杂音。左心衰竭时，心尖部可听到奔马律，肺底听到湿音。全心衰竭时，出现颈静脉怒张、肝肿大和下肢水肿。4．辅助检查 心电图、x线和二维超声检查，证实有左心室肥厚和（或）增大的征象。凡长期高血压患者，伴有左心室肥厚和（或）增大，并能除外冠状动脉粥样硬化性心脏病、主动脉瓣关闭不全、原发性扩张型心肌病等足以引起左心室病变的疾病，方可诊断为高血压性心脏病。【治疗】1.降低血压 未发生心力衰竭时，着重治疗高血压。选用降压药物。2.纠正心力衰竭 可选用强心剂、利尿剂、血管扩张剂或血管紧张素转换酶抑制剂治疗。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com