

肾性甲状旁腺功能亢进\_心血管内科疾病库 PDF转换可能丢失  
图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/611/2021\\_2022\\_\\_E8\\_82\\_BE\\_E6\\_80\\_A7\\_E7\\_94\\_B2\\_E7\\_c22\\_611298.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/611/2021_2022__E8_82_BE_E6_80_A7_E7_94_B2_E7_c22_611298.htm) 在慢性肾功能衰竭长期透析的病人几乎普遍发生继发性甲旁亢。在肾小球滤过率( $lt.1g/d$ )。2 摄取磷结合物 碳酸钙 $1.5 \sim 2.5g$ ，一日3次。为预防铝中毒，应避免应用氢氧化铝。镁盐虽有效，但有高血镁的危险，故不宜使用。3. 补充钙在高磷血症矫正后，应补充钙（使钙摄入高于 $1500mg/d$ ），以达到中性或正性钙平衡。4. 补充活性维生素 $d 1,25(oh)2d3$ （罗钙全） $0.25ug/d$ 口服。假如仍有低钙血症，可口服或静脉冲击治疗：口服罗钙全 $3 \sim 4ug,3$ 次/周，或钙化三醇 $1 \sim 3ug$ ，静脉注射3次/周。5. 严重肾性甲旁亢药物治疗产生耐药，与甲状旁腺增生、腺瘤者，可以手术切除，全切除加自体移植或次全切除术。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)