

颈动脉窦高敏综合征_心血管内科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/611/2021_2022__E9_A2_88_E5_8A_A8_E8_84_89_E7_c22_611314.htm 系颈动脉窦对病理因素或外来刺激敏感性增高，反射性地引起心律减慢，血压下降等反应，weiss于1993年提出本病。引起颈动脉窦高敏综合征的常见诱因有颈部淋巴结肿大，头部肿瘤、颈动脉扩张性刺激、颈动脉管腔狭窄，血管内壁压力升高，咳嗽，排便，猛力搬动重物、穿硬领上衣、紧勒领带、头过度后倾仰等。

临床表现：(1)心脏抑制，表现为反射性心率减慢、房室传导阻滞、血压下降、心脏停搏可达3~5s，由此而发生晕厥。

(2)血管抑制：表现为与心率无关的血压下降。(3)中枢性：晕厥、眩晕、发作时间约数十秒至15min，继之发生血压下降、心率减慢，晕厥系脑血流量急剧减少所致。诊断为颈动脉窦刺激心搏停止达3s以上，血压较发作前下降6.5kpa(50mmhg)。或发生晕厥。本征须与单纯性晕厥、中枢性晕厥、肥厚性心肌病等进行鉴别。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com