

食管自发性破裂\_胸部外科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/611/2021\\_2022\\_\\_E9\\_A3\\_9F\\_E7\\_AE\\_A1\\_E8\\_87\\_AA\\_E5\\_c22\\_611438.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/611/2021_2022__E9_A3_9F_E7_AE_A1_E8_87_AA_E5_c22_611438.htm) 食管破裂多因外伤、异物或腹内压骤然增高（amp.nbsp.如做食管镜、胃镜检查时操作不当所致。【诊断】1.有外伤、吞咽尖锐异物、内窥镜检查或剧烈呕吐史。2.amp.nbsp.伤在颈段食管时，颈部侧位x线片可显示颈后间隙阴影增宽及皮下气肿。伤在胸内食管时可见纵隔气肿或伴有液气胸，amp.nbsp.查体时可发现颈根部有皮下气肿。6.amp.nbsp.伤在颈段食管者，由颈部做切口缝合食管裂口并作引流。3.伤在胸段食管且全身情况良好者，amp.nbsp.伤在食管胸段但全身情况极差，如有中毒休克者，应先控制感染，脓胸引流，提高免疫力，待情况稳定后早日做开胸术缝合食管裂口。5.缝合后即便未能全部愈合，也可以使裂口缩小。应大力加强脓胸的处理，使肺尽快膨胀用以封闭食管裂口。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)