

急性泪腺炎_眼科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议
阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/611/2021_2022__E6_80_A5_E6_80_A7_E6_B3_AA_E8_c22_611502.htm 本病所以少见，是由于：泪腺位于眶上缘下，受其严密保护不易遭受外伤，而且腺的排出管口向下，不易为结膜囊上皮受感染而受者。

泪腺排泄系统周围的淋巴网状细胞对细菌及病毒性感染具有一定的抵抗作用。临床上易和脸腺脓肿或眶蜂窝组织炎相混淆，因此造成误诊或漏诊机会较多。【治疗措施】局部热敷，全身应用抗生素，如已成熟则切开排脓，睑部者由结膜切开，在眶部者则应由皮肤切开。【病因学】各种传染病引起，如腮腺炎、流行性感、伤寒、肺炎，急性咽喉炎等，也可以是周围组织炎症蔓延的结果。另外还有原因不明者，一般均称为原发性，双侧或单侧发病，睑部泪腺较眶部泪腺易受累。常见之病原菌为：葡萄球菌、肺炎链球菌等，少数病例为病毒引起。【临床表现】病变限于睑部腺或眶部腺，甚至同时发炎，局部疼痛流泪，上睑外1/3处睑缘红肿，上睑下垂（炎症），同时伴有眼睑高度水肿，若提起上睑，令眼球下转时，可见泪腺膨出部分，严重者可使眼球向下内出移位，耳前淋巴结肿大压痛，通常1~2周后炎症消退，化脓者可自行穿破形成暂时性瘻管，亦有转变成亚急性或慢性。全身方面可出现全身不适，体温增高等。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com