

泪腺肿瘤_眼科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/611/2021_2022__E6_B3_AA_E8_85_BA_E8_82_BF_E7_c22_611506.htm 泪腺混合瘤为良性肿瘤，含有中胚叶成分及双层腺管上皮组织。泪腺圆柱瘤为恶性肿瘤，由未分化瘤细胞构成。

【诊断】一、眼眶前部外上方肿块，表面光滑，边界清，结节状，质地软硬不一，可有压痛。混合瘤多为中年男性，发展慢，病程长。圆柱瘤多见于老年人，病程短，常复发，易转移。二、肿瘤增大，眼球突出，向内下移位，向外上方运动受限。三、如肿瘤向眶后发展，可压迫眼球后极部，引起视网膜皱褶，或视乳头水肿。四、眼球突出严重者可有眼裂闭合不全，暴露性角膜炎和视神经萎缩。五、x线照片可见泪腺窝扩大，骨质轻度吸收。如骨质破坏，提示肿瘤恶变可能。

【治疗】一、连色膜切除肿瘤。二、肿瘤向眶后部延伸，可眶外壁切开摘除肿瘤。三、若无完整色膜，多次复发或有可能恶变者，应作活检，恶变者作眶内容剜除术，术后放射治疗。四、圆柱瘤无色膜应作彻底眶内容剜除术，破坏的骨壁也应尽可能清除。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com