

急性卡他性结膜炎_眼科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式
，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/611/2021_2022__E6_80_A5_

[E6_80_A7_E5_8D_A1_E4_c22_611507.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/611/2021_2022__E6_80_A5_E6_80_A7_E5_8D_A1_E4_c22_611507.htm) 由分泌物传染，可通过手、毛巾、手帕、水等媒介物等途径传染。致病菌常为葡萄球菌，肺炎球菌，科威杆菌、流感杆菌等。【诊断】一、起病急，双眼同时或先后发病。常有接触患者病史，多见于温暖季节。二、患眼异物感、灼热感，或伴畏光流泪。三、结膜充血，分泌物多，脓性或粘液脓性。严重者眼睑水肿，结膜下出血。可有卡他性角膜溃疡。【治疗】一、分泌物较多者可因生理盐水或3%硼酸溶液冲洗结膜囊。切忌包封患眼。二、局部滴用抗生素眼药水，睡前涂抗生素眼膏。三、本病传染性强，常造成流行，应严格搞好个人及集体卫生。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com