

沙眼_眼科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/611/2021_2022__E6_B2_99_E7_9C_BC__E7_9C_BC_c22_611512.htm

由沙眼衣原体引起的一种慢性传染性结膜角膜炎，病变特点是结膜乳头增生、滤泡、瘢痕形成和角膜血管翳。【诊断】一、可有痒感、异物感、干涩感等，有的无任何不适。二、结膜病变以上睑结膜和上穹窿部为明显。有结膜充血肥厚，乳头增生呈绒状颗粒，滤泡形成，瘢痕形成。瘢痕形成是沙眼特征病变之一。三、角膜血管翳，也是沙眼的特征病变之一，在沙眼早期即可出现。记录法系将角膜水平分成四等分，以p代表角膜血管翳。

p1为血管翳波及的面积小于1/4.p2为1/4 ~ 1/2.p3为大于1/2，同时两侧及下部也被波及.p4为波及全部角膜。四、沙眼诊断依据，1979年中华医学会眼科学会决定为：上穹窿部和上睑结膜血管模糊，乳头增生或滤泡，或兼有两者；用放大镜或裂隙灯显微镜检查可见角膜血管翳；上睑结膜或（和）上穹窿部出现瘢痕；结膜刮片有沙眼包涵体。在第一项基础上兼有其他三项之一者可诊断为沙眼。沙眼分期表分期依据分级

活动病变占上睑结膜总面积 第一期(沙)上穹窿部和上睑结膜有活动性病变(血管模糊、充血、乳头增生、滤泡形成)轻() gt.2/3 第二期(沙)有活动性病变，同时出现瘢痕 轻() gt.2/3 第三期(沙)仅有瘢痕而无活动性病变 五、并发症和后遗症，有睑内翻与倒睫、慢性泪囊炎、沙眼性睑下垂、睑球粘连、角膜溃疡、实质性结膜干燥症等，则有相应的症状和体征。

【治疗】一、局部用药，0.1%利福平或0.1%酞丁安等滴眼液，金霉素、四环素、红霉素等眼膏。二、手术治疗，滤泡

挤压术以缩短病程。三、治疗并发症。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com