

绿脓杆菌性角膜溃疡_眼科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/611/2021_2022__E7_BB_BF_E8_84_93_E6_9D_86_E8_c22_611516.htm

细菌性角膜炎角膜外伤后细菌继发性感染所致。由葡萄球菌等引起的急性化脓性角膜溃疡称为匍行性角膜溃疡，病变常向角膜中心发展，形成一进行缘，常伴前房积脓。由绿脓杆菌引起的烈性化脓性角膜溃疡称为绿脓杆菌性角膜溃疡，症状重，溃疡发展快，1~3天内可发展至全部角膜，分泌物呈典型的黄绿色。【诊断】

一、常有角膜上皮损伤史。绿脓杆菌性角膜溃疡常有角膜异物剔除史。二、起病急，尤其是绿脓杆菌性角膜溃疡。三、角膜刺激症状明显。四、溃疡面有大量脓性坏死物，其周围有浓厚的黄白色浸润，结膜囊内有化脓性分泌物。绿脓杆菌性角膜溃疡的分泌物常带黄绿色。五、前房多有积脓。六、溃疡坏死组织作培养可找到致病菌。【治疗】

一、滴用高浓度抗菌素眼药水。配制高浓度的青霉素、链霉素、庆大霉素、卡那霉素、泰利必妥、托百士（妥布霉素）等眼药水滴眼。次数应频，溃疡面好转，滴眼次数减少。可加抗菌素眼膏涂眼。绿脓杆菌性角膜溃疡用多粘菌素、粘霉素治疗。二、结膜下注射抗菌素。适应于溃疡急性发展阶段，尤其无法做到频繁滴眼的患者。三、持续散瞳，直到溃疡愈合，浸润明显消退为止。四、溃疡愈合后，除继续滴用抗菌素药水外，可滴用激素眼药水，以减少局部浸润。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com