

真菌性角膜炎\_眼科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/611/2021\\_2022\\_\\_E7\\_9C\\_9F\\_E8\\_8F\\_8C\\_E6\\_80\\_A7\\_E8\\_c22\\_611517.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/611/2021_2022__E7_9C_9F_E8_8F_8C_E6_80_A7_E8_c22_611517.htm) 角膜上皮损伤后继发

真菌感染的角膜炎，主要为曲菌、镰刀菌等感染。【诊断】一、常有农业性外伤史，如树木、草等枝叶擦伤角膜等。二、主觉刺激症状常较轻微，与严重的充血、角膜病变程度和前房积脓现象甚不相称。三、角膜溃疡形态不一，发展较慢，溃疡多呈圆形或椭圆形，黄白色或淡黄色，表面粗糙不平，较干燥，坏死组织似牙膏状，易刮除，溃疡周围有卫星灶。四、前房常有脓液，粘稠，常无液平面。五、取溃疡坏死组织涂片检查，常可找到真菌菌丝，作真菌培养，一般可有真菌生长。【治疗】一、使用抗真菌药水和眼膏。二性霉素，金褐霉素，磺胺醋酰钠、制霉菌素，咪唑类（益康唑、酮康唑）、氟康唑（大扶康）等。二、对溃疡浅而小者用5%碘酒作角膜烧灼可有效。三、充分散瞳。四、手术治疗：结膜瓣遮盖术或角膜移植术。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)