

单纯疱疹性角膜炎_眼科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/611/2021_2022__E5_8D_95_E7_BA_AF_E7_96_B1_E7_c22_611518.htm 病毒性角膜炎由病毒引起的角膜炎，以单纯疱疹性病毒为最常见。【诊断】一、常有发热病史，病程长，易复发。二、角膜病变主要分布于基质浅层。初为点状浸润，呈条状或簇状排列，可融合成条状或树枝状、星芒状、盘状或地图状浸润病灶，然后形成浅在角膜溃疡。三、常伴有不同程度的葡萄膜反应，表现虹睫炎或葡萄膜炎。【治疗】一、用抗病毒眼药水和眼药膏。疱疹净、无环鸟苷、病毒唑、正大捷普等。加用抗菌素眼药水防继发感染。二、病变顽固不愈者，可结膜下注射胎盘球蛋白、干扰素等。三、20%硫酸锌烧灼角膜溃疡面。四、充分散瞳。五、溃疡面业已愈合，可在滴用大量抗病毒眼药水的同时，加用少量激素眼药水。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com