

角膜软化症_眼科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议
阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/611/2021_2022__E8_A7_92_

[E8_86_9C_E8_BD_AF_E5_c22_611523.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/611/2021_2022__E8_A7_92_E8_86_9C_E8_BD_AF_E5_c22_611523.htm) 长期维生素a缺乏所

致的严重眼病，在角膜结膜上皮干燥基础上发生的角膜基质

性病变。【诊断】一、有高度营养缺乏史，多见于高烧、腹

泻幼儿或人工喂养的婴儿。二、眼部表现可分为四个阶段：

（一）夜盲期：夜间视力不好，暗适应功能差。（二）干燥

前期：球结膜和角膜表面失去光泽，弹性减退，眼球转动时

球结膜可折叠成与角膜缘同心的皱纹圈，角膜知觉减退。（

三）干燥期：球结膜干燥加重，在睑裂部球结膜上出现银灰

色蜡样三角形斑（bitot氏斑）、眼泪不能湿润其表面，结膜

常有色素沉着，呈灰蓝色调，角膜毫无光泽，知觉完全丧失

。（四）角膜软化期：为最严重阶段，球结膜干燥更重，并

出现角膜基质浸润，继而形成溃疡和前房积脓。若继发细菌

感染，则溃疡恶化，角膜穿孔。【治疗】一、对因治疗（一

）积极治疗内科疾病，改善营养。（二）口服维生素ad丸、

维生素a、鱼肝油等。（三）浓缩鱼肝油滴眼。（四）严重病

例肌注维生素ad针剂。二、滴抗生素眼药水，防继发感染。

三、有角膜溃疡或前房积脓者，应及时充分散瞳。100Test 下

载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com