

先天性白内障_眼科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/611/2021_2022__E5_85_88_E5_A4_A9_E6_80_A7_E7_c22_611531.htm (发育性白内障)

胎儿发育过程中晶体发育障碍所致白内障。【诊断】表现为各种形态和部位的晶体混浊，绕核性白内障最常见。【治疗】

一、手术时机的选择1.双眼完全性先天性白内障，应在出生后3~4个月内手术。第二眼须在一周内手术。2.不完全性先天性白内障，视轴30%被遮盖或视力 ≤ 0.2 也应立即手术。二、植入人工晶体的指征单眼植入最早年龄3岁，双眼5~6岁。3岁以下手术时不植入人工晶体，留待以后二期植入。术后选用隐形眼镜(6/12~10岁儿童有极好的耐受性)或框镜。三、术式选择角膜缘切口+前囊连续环形撕囊，孔距6mm+注吸系统吸净皮质+后囊连续环形撕囊，孔径2~4mm+有限的前部玻璃体切割+后房型人工晶体植入。四、视功能的重建1.矫正屈光不正。无晶体眼应配镜。人工晶体术后屈光状态不准确的也应充分矫正。2.治疗弱视。遮盖疗法最好。白内障术后2~3周即开始。1岁以前遮盖90%清醒时间，1岁以后50%。要坚持至视力的形成和稳定，至6~10岁。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com