

玻璃体出血\_眼科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议  
阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/611/2021\\_2022\\_\\_E7\\_8E\\_BB\\_E7\\_92\\_83\\_E4\\_BD\\_93\\_E5\\_c22\\_611542.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/611/2021_2022__E7_8E_BB_E7_92_83_E4_BD_93_E5_c22_611542.htm) 由周围组织如视网膜或脉络膜血管破裂，出血进入玻璃体所致。网膜大面积缺血后新生血管形成并出血和眼外伤，眼内手术亦可引起出血。

**【诊断】**症状：发病一般较突然。少量出血对视力影响不大。大出血可有红视症，视力骤减，或仅存光感。体征：少量出血可见玻璃体混浊，大量出血看不到眼底，瞳孔区呈暗黑色。**【治疗】**病因治疗：尽可能查出病因并治疗，预防反复出血。对症治疗：大量或反复出血时，新鲜出血应卧床，包盖双眼，全身给予止血剂。出血停止后采用促进吸收药物如透明质酸酶， - 糜蛋白酶和尿激酶。晚期用碘剂。出血停止后3个月混浊不吸收考虑作玻璃体切除术。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)