

恶性青光眼_眼科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议
阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/611/2021_2022__E6_81_B6_E6_80_A7_E9_9D_92_E5_c22_611548.htm

睫状环阻滞性闭角型青光眼（恶性青光眼）本病与小眼球、小角膜、晶体过大及睫状环小的解剖因素相关，内眼手术，炎症，外伤及局部点缩瞳剂是引起本病的诱发因素。【诊断】（1）常有内眼手术史，尤其是抗青光眼手术史，术前存在高眼压，浅前房，小角膜。（2）发病急，自觉症状与急性闭角型青光眼相似。

（3）前房极浅或消失，虹膜与角膜紧相贴，眼压升高显著，缩瞳剂不但不能降压反而引起眼压进行性升高。【治疗】（1）使用散瞳睫状肌麻痹剂，常用阿托品，东莨菪碱，后马托品，每天2~4次，禁用任何缩瞳剂。（2）高渗剂：常用有甘油、甘露醇、尿素、山梨醇。（3）碳酸酐酶抑制剂：常用有醋氮酰胺。（4）-受体阻滞剂：噻吗心安、贝他根、贝特舒。（5）皮质类固醇：全身或局部使用，减轻炎症，减少渗出，减轻睫状体水肿。（6）手术治疗：如扁平部抽吸玻璃体积液及前房注液或注气。晶体摘除，玻璃体切割。（7）激光治疗：氩激光光凝睫状突。（8）冷冻治疗。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com