

视神经萎缩_眼科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议
阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/611/2021_2022__E8_A7_86_E7_A5_9E_E7_BB_8F_E8_c22_611564.htm 视神经以往无水肿或炎症迹象称原发性视神经萎缩，以前有水肿称继发性萎缩。一般均由于视纤维在外侧膝状体以前段受病所致。【诊断】一、外伤、炎症、中毒、缺血病史。二、视力下降，重者可致失明，部分伴有全身症状。三、眼底原发性视神经萎缩所见视乳头界清晰、色淡，视乳头界缘上小血管数少于9~10支，视网膜动脉较细。继发性视神经萎缩常见视盘境界不清，从视盘表面的神经胶质组织扩展至视网膜，视盘表面的血管阻塞。四、色觉异常视诱发电位表现振幅下降，潜伏期延长。五、视野炎症或中毒引起，常有中心暗点或周边视野缩小。压迫所致常出现双颞侧偏盲，视交叉后角受压可出现同侧偏盲。六、ct或mri对颅内占位所致视神经萎缩很有必要，以免误诊。【治疗】根据病因，对症治疗。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com