

眶假瘤\_眼科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/611/2021\\_2022\\_\\_E7\\_9C\\_B6\\_E5\\_81\\_87\\_E7\\_98\\_A4\\_\\_c22\\_611583.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/611/2021_2022__E7_9C_B6_E5_81_87_E7_98_A4__c22_611583.htm)

是一种眶内慢性非特异性增殖性炎症。【诊断】一、多见于中年男性，单眼。二、起病较急，病程长短不一，常复发。三、眼球突出和眼痛。眼睑和结膜水肿，眼球运动障碍和复视，眼底有压迫征。四、眶内可扪及肿物，质硬，界不清，可有压痛。五、x线平片：眼眶轻度扩大，可有骨质吸收。ct图象可见单条增粗眼外肌，边界不规则。b超显示巩膜增厚，球筋膜囊加宽，眼外肌增粗。六、激素和抗菌素治疗，症状可明显减轻。【治疗】一、激素和抗菌素联合治疗，可加用环磷酰胺。二、放疗治疗：以淋巴细胞型为主。三、手术治疗：当眼球突出严重，药物治疗无效时可配合手术，摘除瘤体。如已无视力、且疼痛剧烈，肿瘤占满眶腔者，可行眶内容剝除术。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)