

疣\_整形外科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/611/2021\\_2022\\_\\_E7\\_96\\_A3\\_\\_E6\\_95\\_B4\\_E5\\_BD\\_A2\\_c22\\_611590.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/611/2021_2022__E7_96_A3__E6_95_B4_E5_BD_A2_c22_611590.htm) 疣（wart）是由病毒引起的一种皮肤表面赘生物，其病各首见与《内经》。多见于儿童及青年，潜伏期为1~3个月，能自身接扩散。病毒存在于棘层细胞中，可促使细胞增生，形成疣状损害。常见的有寻常疣、扁平疣、传染性软疣、尖锐湿疣等。中医学称之为疣目、鼠乳、枯筋箭、千日疮、痂疮、悔气疮，俗称“瘰子”或“坚头肉”。【诊断】根据临床表现，结合病理检查，即可确诊，但应与增殖型肛周结核、生殖器癌、生殖器鲍文样丘疹病相鉴别。【治疗措施】(一)内治法：1.中药内服：治宜清热解毒，养血活血，软坚散结，方用治疣汤。若风热湿毒较重者，可加土茯苓、薏苡仁、骊齿苋、白花蛇舌草；若肝虚血燥，筋气不荣者，可加珍珠母，可加珍珠母、白芍、生牡蛎、赤小豆；若肾阴亏虚，肝血不足者，改用归芍地黄汤加川芎、牛膝。2.西医内治法：以下方法可任选一种：病毒素0.1g，每日3次口服；乌洛托品0.3g~0.6g，每日3次口服；10%水杨酸铋油2ml肌注；1%酒石酸锑钾3~5ml，静注，每周2次；干扰素2~5ml，肌注，每周1次。(二)外治法：可酌情选用下述方法，但均需注意保持健康皮肤。1.万灵丹腐蚀剂：樟丹1.5g，水杨酸25g，普鲁卡因1g，白糖1.5g，95%酒精调成糊状，帖敷疣体。2.鸭蛋子仁捣烂贴患处，每日换药1次，一般2~3次即可治愈。或用鸭蛋子油（鸭蛋子1份，花生浸泡半月）点涂患处。3.纯碱加生石灰等量，用2%普鲁卡因溶液调成糊状，外敷疣体。当局部有灼热感时，停

止敷药。4.复方水杨酸火棉胶（水杨酸、乳酸各30g，弹性炎棉100g），将患处用温水泡5分钟，待擦干后，直接用本品涂抹疣体，每日1次，本品为较好的角质溶解剂，为易燃物，注意保护。5.《外科启玄》记载：“用鸡胫皮擦之自愈，一法将蕲艾在初生第一个上灸之，余皆自落而痊矣”。(三)注射疗法：1.可用2.5%碘酊0.1~0.2ml，或用18%盐水酌加2%普鲁卡因溶液，每次0.5~1ml，注射于疣体基底部，1周左右疣体即于干燥脱落。2.干扰素0.5~1ml，疣体注射，每周1次，也可用干扰素溶液局部喷洒。(四)手术疗法：可酌情选用冷冻、电灼、激光、手术切除等方法，但需注意保留健康皮肤或皮岛，以防瘢痕挛缩，避免肛门狭窄。【病因学】中医学认为，本病系阴血不足，肝失荣养，气血不和，血枯生燥，筋气外发于肌肤，或风毒之邪侵袭，阻于经络，凝聚肌肤而成。现代医学认为，疣为病毒性皮肤病，寻常疣、扁平疣、尖锐湿疣均由乳头瘤病毒引起，三者都有表皮角化过度，棘层肥厚，皮突延长等病理改变。传染性软疣是由传染性软疣病毒（属痘类病毒）引起，表皮细胞内含有软化疣小体和发生变性是其特征。【临床表现】由于疣的种类不同，临床表现各异：扁平疣呈米粒及芝麻大扁平隆起的损害，表面光滑，色浅褐或正常皮色。传染性软疣初起为米粒大、半球形丘疹，中心有小白点，逐渐增至如绿豆大，境界明显，质硬，中心凹陷似脐窝，呈灰白、乳白、微红或正常皮色，表面光滑。损害数目不定，少数散在，或数个簇集，不想融合，可挤出白色乳酪样物。寻常疣初起为米粒大小，微黄色角化性丘疹，中央可见一针头小红点，逐渐增至绿豆大小，圆形或多角形乳头状隆起，境界明显，质硬，表面粗糙呈刺状，灰白，污

染或污褐色。初发常为1个，长期不变或不断增多，邻近者互相融合，有时可自身接种。尖锐湿疣详见性传播疾病 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)