

表皮样囊肿_整形外科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，
建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/611/2021_2022__E8_A1_A8_E7_9A_AE_E6_A0_B7_E5_c22_611594.htm

皮样囊肿或表皮样囊肿为胚胎发育时期遗留于组织中的上皮发展形成的囊肿：后者也可由于损伤、手术使上皮细胞植入而形成，皮样囊肿囊壁较厚，有皮肤及皮肤附件（如汗腺、毛囊等）组成，囊腔内有脱落的上皮细胞、皮脂腺、汗腺和毛发等结构。【诊断】1.生长缓慢的无痛性肿块；2.检查为较深在界限清楚的肿块，扪有面团感；3.穿刺抽吸物为豆渣样，镜下可见脱落上皮细胞、毛囊和皮脂腺等；4.病理组织学检查确诊。【治疗措施】手术治疗，手术预防感染用药5～7日。皮样、表皮样囊肿为良性肿物，其与周围组织间有很明显的界限，所以手术很容易摘出，手术创伤很小，且本病非手术治疗无效，所以一旦诊断确立，应予手术治疗，切勿使用放疗或化疗，更不宜使用民间一些不明成份的药物内服外敷，少数并发感染者可先使用抗生素控制感染后再行手术治疗。【临床表现】1.好发于口底、颌下、眼睑、额、鼻、眶外侧、耳下等部位，多见于儿童及青年。2.生长缓慢。3.常为球形、深在、界限清楚、触有面团感，一般无自觉症状。【辅助检查】1.对于临床表现较典型，术前诊断已较明确者检查专案以检查框限“ A ”为主；2.对于临床表现不典型，鉴别诊断较困难者或肿瘤巨大者检查专案可包括检查框限“ B ”和“ A ”。【治愈标准】1.治愈：囊肿完整摘除，创口基本愈合；2.好转：治疗后，囊肿尚有残留；3.未愈：并发感染者行抗炎治疗或切开引流后，感染症状有好转，但未手术摘除囊肿。 100Test

下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com