

先天性颅缝早闭_整形外科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/611/2021_2022__E5_85_88_E5_A4_A9_E6_80_A7_E9_c22_611598.htm

【诊断】 颅缝早闭征是指颅骨骨缝的骨性融合时间早于正常年龄。1. 病因发育异常，具体原因不清。2. 临床表现（1）颅面部畸形根据骨缝闭合的早晚和受累骨缝的多少，表现出不同的畸形。1）额缝早闭表现为三角头畸形。2）矢状缝早闭为舟状头畸形。3）单侧冠状缝早闭为斜头畸形。4）双侧冠状缝早闭为短头畸形。5）冠状缝及矢状缝早闭表现为尖头畸形等。（2）伴有不同程度的颅内压增高及其他症状1）头痛。2）呕吐。3）眼球突出。4）智力障碍。5）肢体活动障碍等。（3）x线检查可能有：1）颅缝处骨质增厚、密度增加。2）脑回压迹加深。3）各颅窝变深等。**【治疗】** 应早期手术以解除颅内压增高，有利于大脑发育。方法有：1. 颅缝线状切开术将所有可能发生骨化的骨缝全部松解，使骨块移至正常解剖位置。2. 骨板固定法将已经矫正和前移的前额骨瓣仅与鼻根部及眶壁固定，而不与颅穹隆相连接，使前额骨瓣处于浮动状态，有利于大脑的生长发育及利用大脑发育对骨产生推力。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com