

眉毛和睫毛缺损或畸形_整形外科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/611/2021_2022__E7_9C_89_E6_AF_9B_E5_92_8C_E7_c22_611611.htm 眉缺损【诊断】1. 原因先天性，创伤，烧伤。2. 临床表现 部分或全部眉毛区无毛发生长，为正常皮肤或瘢痕组织所代替。【治疗】1. 非手术

疗法 通过文身的方法，达到双侧眉颜色或轮廓接近的目的。2. 手术疗法（1）头皮游离移植 于乳突区后或枕下部切除条状头皮，厚度达毛囊深层；在眉毛区形成创面，将切取的头皮植于受区，并加压包扎。（2）游离毛发移植 切取头皮，将其分割成众多含数个毛囊的小单位。每个小单位独立移植，再造眉毛。（3）颞浅动脉岛状头皮瓣 在患侧同侧解剖分离颞浅动脉蒂，保留1.5cm左右宽的筋膜组织在血管蒂上，以保护血管和有利静脉回流。在蒂的尖端按正常或标准大小、外形设计头皮瓣，皮瓣尽可能在动脉长轴上，同时照顾到毛发的生长方向。将掀起的带蒂皮瓣经皮下隧道转移至受区创面（与正常对称，考虑到体位的影响），细线缝合。应加压包扎，促进静脉回流。对双侧眉缺损患者，可用双侧颞浅动脉岛状头皮瓣，也可酌情用单侧颞浅动脉岛状头皮瓣。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com