

耳轮和耳垂缺损_整形外科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/611/2021_2022__E8_80_B3_E8_BD_AE_E5_92_8C_E8_c22_611621.htm

耳轮缺损【诊断】 1. 致病原因 外伤（如咬伤）、感染、烧伤或冻伤等。2. 临床表现 多单侧，耳轮部分或全部缺损。**【治疗】** 根据缺损的大小、部位和局部组织情况，选用适当的手术方法。1. 直接缝合法 适用于较小的缺损。2. 耳轮推进缝合法 适用于局限于耳轮部较小的缺损。在缺损区一侧或两侧、耳轮与对耳轮交界处做切口形成耳轮皮瓣，向缺损区推进覆盖。3. 局部皮瓣法 在耳郭后面或耳后乳突区或在耳前切取皮瓣，带蒂转移，修复缺损。4. 耳郭复合组织游离移植法 切取对侧耳轮组织，游离移植于缺损区。5. 皮管移植法 常用于后期修复在耳后乳突区、颈部等部位形成细长皮管，分期向缺损区转移。适用于范围较大的缺损。

耳垂缺损【诊断】 1. 致病原因：主要是外伤所致，偶尔发生于切除穿耳孔后并发的瘢痕疙瘩后。2. 临床表现 局限于耳垂的耳郭缺损。**【治疗】** 常用局部皮瓣自相折合修复耳垂缺损。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com