

先天性腭裂_整形外科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，
建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/611/2021_2022__E5_85_88_E5_A4_A9_E6_80_A7_E8_c22_611633.htm 【诊断】

1. 原因：先天性。2. 临床表现（1）上腭前后方向部分或全部裂开，口鼻腔相通。（2）存在不同程度的吸吮功能障碍。（3）发音不清晰。2. 分类：根据涉及范围：分为单侧裂和双侧裂。根据裂隙程度也可分为：悬雍垂裂、隐裂、软腭裂、不完全性裂和完全性裂。【治疗】1. 修复手术基本步骤(1)做松弛切口(2)剥离粘骨膜瓣(3)剖开裂隙边缘(4)处理腭神经血管束(5)翼钩的处理(6)分离鼻腔粘膜(7)剪断或松解腭腱膜（8）缝合(9)填塞创口2. 主要手术方法(1)改良兰氏法:临床上应用较多的方法。基本步骤即在腭部两侧做松弛切口，在骨膜下分离，形成两个粘骨膜瓣；为充分松弛粘骨膜瓣，达到裂隙无张力缝合的目的，需离断腭腱膜和翼钩，适当解剖游离腭神经血管束。（2）单瓣后退术：主要适用于软腭裂。基本原则即是在腭部掀起一个蒂在后的舌形粘骨膜瓣，做腭腱膜和翼钩及神经血管束处理后，向后推移，关闭裂隙。后退的目的在于增加软腭的长度，有利于改进发音。（3）双相反“z”成形术:又称furlow双“z”字设计方向相反，缝合口互相交差。此法可以延长软腭，缩短两侧松弛切口、避免在硬腭部掀起大的粘骨膜瓣，另外能够改善腭帆提肌的方向。（4）兰氏法加咽后壁瓣。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com